

 โรงพยาบาลหญิง จุฬาลงกรณ์	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การถอดสายสวนปัสสาวะ	หน้า 1 / 2
		เลขที่ WI-NUR-032
		ฉบับที่ <input type="checkbox"/> ต้นฉบับ <input type="checkbox"/> สำเนาที่.....
ชื่อหน่วยงาน : งานผู้ป่วยใน		วันที่ประกาศใช้
ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวสำราญ โพธิ์ทอง) หัวหน้างานผู้ป่วยใน	ผู้อนุมัติ : (นางวิรวัดย์ ตันจรินทร์) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	1 ก.พ.2564 แก้ไขครั้งที่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอดสายสวนปัสสาวะ ได้แก่ การติดเชื้อ trauma

ขอบข่าย

หน่วยงานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยฉุกเฉิน หน่วยงานผู้ป่วยห้องคลอด

อุปกรณ์ / เครื่องมือ

- | | |
|-------------------|-------|
| 3.1 Syringe 10 cc | 1 อัน |
| 3.2 Set flush | 1 set |
| 3.3 ถุงพลาสติก | 1 ใบ |
| 3.4 ถุงมือสะอาด | 1 คู่ |

ความรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ

คำจำกัดความ

การถอดสายสวนปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ ที่สวนผ่านท่อปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง

WHO. Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare 2009: Centers for Disease Control and Prevention
online Resources, Inc; 2011 May [cited 2015 Nov] Available from
<http://www.cdc.gov/handhygiene/Guidelines.html>

วิธีปฏิบัติ

1. ตรวจสอบแผนการรักษา
2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ
3. ล้างมือแบบ Hygienic hand wash หรือ ใช้ Alcohol rub ตามมาตรฐานการล้างมือ 7 ขั้นตอน
4. เตรียมอุปกรณ์
5. ใช้ Alcohol rub ล้างมือตามมาตรฐานการล้างมือ 7 ขั้นตอนอีกครั้ง
6. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์

7. ใช้ Syringe ดูดน้ำกลั่นออกจากบอลูนให้หมด
8. บีบพับสายสวนไว้และค่อยๆดึงออก
9. ลงบันทึกรายงาน
10. เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ

ก่อนและหลังเทปัสสาวะทุกครั้งจะต้องเช็ดท่อทางออกปัสสาวะด้วย Alcohol 70% หลีกเลียงการปลด connection tube

ตัวชี้วัด

อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ = 0

